


# 図1 有症状者での検査の考え方

タイミング	症状出現9日目以内	症状出現10日目以降 <sup>3</sup>
採取材料	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>鼻咽頭・鼻腔<sup>1</sup></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>唾液<sup>2</sup></p> </div> </div>	
選択可能な検査	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>核酸検査</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>抗原検査 (定量)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>抗原検査 (定性)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>核酸検査</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>核酸検査 (定量)</p> </div> </div>	
偽陽性または偽陰性を疑う場合の追加検査	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>核酸検査</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>核酸検査 または 抗原検査 (定量)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>核酸検査</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>核酸検査 または 抗原検査 (定量)</p> </div> </div>	

<sup>1</sup> 鼻腔より鼻咽頭の方が検出感度が良い  
<sup>2</sup> 唾液は抗原検査（定性）には推奨されない  
<sup>3</sup> 10日目以降の検査材料として唾液は推奨されない

## 図2 無症状者での検査の考え方



<sup>1</sup>鼻腔ぬぐい液による検査は推奨されていない

<sup>2</sup>抗原検査（定性）は推奨されていない

\*検査法別の検出感度は、

精製したRNAによる核酸検査 > 簡易抽出による核酸検査（ダイレクトPCR） ≒ 抗原検査（定量） > 抗原検査（定性）  
と考えられている